

【膵・胆道がん】

(2024年4月更新)

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
GEM療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1、8、15	28日
S-1+GEM療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1、8	21日
	テガフル/ギメラシル/オテラシル	80mg/m ²	経口	—	d1夕～15朝	
GEM+CDDP療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1、8	21日
	シスプラチン	25mg/m ²	点滴	1時間	d1、8	
デュルバルマブ +GEM+CDDP療法 ※9コース目以降は デュルバルマブのみ投与	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴	1時間	d1	21日
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1、8	
	シスプラチン	25mg/m ²	点滴	1時間	d1、8	
GEM+nab-PTX療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1、8、15	28日
	アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m ²	点滴	30分	d1、8、15	
FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間	d1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	5分	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間	d1	
GEM+Erlotinib療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1、8、15	28日
	エルロチニブ	100mg/body	経口	—	連日	
nal-IRI+5FU/I-LV療法	nal-イリノテカン	70mg/m ²	点滴	90分	d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間	d1	