

【尿路上皮がん】

(2025年4月更新)

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
GC療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1、8、15	28日
	シスプラチン	70mg/m ²	点滴	2時間	d2	
GCarbo療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1、8、15	28日
	カルボプラチン	AUC5	点滴	1時間	d2	
ペムブロリズマブ療法(3週間)	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	d1	21日
ペムブロリズマブ療法(6週間)	ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴	30分	d1	42日
アベルマブ療法	アベルマブ	10mg/kg	点滴	1時間	d1	14日
EV療法	エンホルツマブベドチン	1.25mg/kg	点滴	30分	d1、8、15	28日
Nivo療法(2週間)	ニボルマブ	240mg/body	点滴	30分	d1	14日
Nivo療法(4週間)	ニボルマブ	480mg/body	点滴	30分	d1	28日
EV+ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	d1	21日
	エンホルツマブベドチン	1.25mg/kg	点滴	31分	d1、8	